

Navodilo za uporabo

Zolsana 10 mg filmsko obložene tablete zolpidemijev tartrat

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Zolsana in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Zolsana
3. Kako jemati zdravilo Zolsana
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Zolsana
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Zolsana in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Zolsana vsebuje učinkovino zolpidem, ki je predstavnik novejšje generacije nebenzodiazepinskih uspaval.

Zdravilo Zolsana se uporablja za kratkotrajno zdravljenje hude in moteče nespečnosti pri odraslih.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Zolsana

Ne jemljite zdravila Zolsana

- če ste alergični na zolpidemijev tartrat ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate sindrom prenehanja dihanja med spanjem (močno smrčanje z dolgimi premori med izdihom in vdihom),
- če imate močno zmanjšano delovanje jeter,
- če imate miastenijo gravis (hudo mišično oslabelost),
- če imate hudo respiratorno insuficienco (hude težave z dihanjem),
- če ste kdaj po jemanju zdravila Zolsana ali drugih zdravil, ki vsebujejo zolpidem, hodili v spanju ali se drugače nenavadno vedli med spanjem. Med ta vedenja spadajo na primer vožnja avtomobila, uživanje hrane, telefonski pogovori ali spolni odnosi med spanjem, ne da bi bili popolnoma budni.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Zolsana se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

- pri depresiji: Tako kot druga uspavala ali pomirjevala je treba tudi zdravilo Zolsana uporabljati previdno pri bolnikih s simptomi depresije ali tesnobe, ki jo spremlja depresija. V določenih okoliščinah, če osnovna bolezen ni zdravljena z ustreznimi zdravili (antidepresivi), se lahko simptomi depresije poslabšajo. Pri teh bolnikih se lahko poveča tveganje za samomor. Med jemanjem zdravila Zolsana lahko postane očitna depresija, ki pred tem ni bila opažena.

Študije kažejo povečano pojavnost samomora in poskusov samomora pri bolnikih z depresijo ali brez nje, ki jemljejo uspavala, kot je zdravilo Zolsana. Vzročna povezava ni bila dokazana. Takoj povejte zdravniku, če se pri vas pojavijo samomorilne misli (misli o samopoškodovanju ali samomoru) ali samomorilno vedenje.

- pri odvisnosti: Tako kot pri jemanju drugih uspaval lahko tudi pri jemanju zdravila Zolsana pride do razvoja psihične in fizične odvisnosti. Tveganje za razvoj odvisnosti se poveča z večjimi odmerki zdravila in dolžino zdravljenja. Če pride do fizične odvisnosti, nenadno prekinitev zdravljenja spremljajo odtegnitveni simptomi. Priporočljivo je postopno zmanjševanje odmerka zdravila Zolsana.
- pri nagnjenosti k zlorabi psihoaktivnih snovi ali alkohola: v takem primeru se tveganje za razvoj odvisnosti še poveča.
- pri toleranci za zdravilo: pri večkratnem jemanju zdravila v času nekaj tednov lahko opazite zmanjšano učinkovitost zdravila.
- pri povratni nespečnosti: pri prekinitvi zdravljenja lahko pride do povratne nespečnosti (ponovno se pojavijo okrepljeni simptomi, zaradi katerih je bilo zdravljenje uvedeno).
- pri amneziji: benzodiazepini in njim podobne učinkovine lahko povzročijo anterogradno amnezijo (izgubo spomina za dogodke po zaužitju zdravila). Najpogosteje se pojavi nekaj ur po zaužitju zdravila. Svetujemo vam, da si zagotovite vsaj 8 ur nemotene počitka, saj se tako zmanjša tveganje za amnezijo.
- pri psihiatričnih in paradoksnih reakcijah: pri zdravljenju z benzodiazepini in njim podobnimi učinkovinami lahko zasledite paradokсне reakcije (nemir, razdražljivost, agresivnost, blodnje, napade besa, nočne more, halucinacije, psihotične reakcije in neprimerno vedenje). Pogosteje se pojavijo pri starejših bolnikih. V primeru navedenih težav vam bo zdravnik svetoval prekinitev zdravljenja.
- pri starejših, oslabeledih in bolnikih z zmanjšanim delovanjem jeter: potrebna je previdnost pri uporabi zolpidema, zato bo zdravnik predpisal manjše odmerke zdravila. Pri starejših bolnikih je priporočljiva previdnost zaradi tveganja za padce, zlasti ob vstajanju ponoči.
- pri kronični (dolgotrajni) težavi z dihanjem: potrebna je previdnost, ker lahko zolpidem poslabša dihalno zmogljivost.
- pri duševnih boleznih z blodnjami (psihoze): za zdravljenje teh bolezni morate prejemati ob zolpidemu še druga zdravila.
- čeprav pri bolnikih z okvaro ledvic zmanjšanje odmerka ni potrebno, je pri jemanju zolpidema vseeno potrebna previdnost.
- pri bolnikih s posebno prirojeno motnjo v srčnem prevajanju (»sindromom dolgega intervala QT«) je potrebna previdnost. Preden začnete jemati zdravilo Zolsana, bo zdravnik skrbno pretehtal koristi in tveganja.

Z zdravnikom se posvetujte, če so zgornje navedbe veljale za vas kadarkoli v preteklosti.

Hoja v spanju in druga podobna vedenja

Zdravilo Zolsana lahko povzroči hojo v spanju ali druga nenavadna vedenja med spanjem. Med ta vedenja spadajo na primer vožnja avtomobila, priprava in uživanje hrane, telefonski pogovori ali spolni odnosi med spanjem, ne da bi bili popolnoma budni. Naslednje jutro se morda ne boste spomnili, kaj ste počeli ponoči. Če opazite kaj od zgoraj navedenega, takoj prenehajte jemati zdravilo Zolsana in se posvetujte z zdravnikom, saj lahko tako vedenje med spanjem povzroči resno tveganje za poškodbe pri vas in drugih.

Uživanje alkohola ali sočasno jemanje drugih zdravil, ki povzročajo zaspanost, lahko poveča tveganje za pojav teh vedenj med spanjem.

Psihomotorična prizadetost naslednji dan (glejte tudi poglavje Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev)

Na dan po uporabi zdravila Zolsana je lahko tveganje za psihomotorično prizadetost, vključno s prizadeto zmožnostjo za upravljanje vozil, večje:

- če to zdravilo vzamete manj kot 8 ur pred izvajanjem dejavnosti, ki zahtevajo zbranost,

- če vzamete odmerek, ki je večji od priporočenega,
- če vzamete zolpidem medtem, ko že jemljete kakšen drug zaviralec osrednjega živčevja ali druga zdravila, ki zvišajo koncentracijo zolpidema v krvi, ali če pijete alkohol ali uporabljate prepovedane droge.

Zdravilo vzemite v enem zaužitju tik pred spanjem.

Isto noč ne smete vzeti še enega odmerka.

Jemanje zolpidema lahko povzroči padce, ki imajo lahko za posledico resne poškodbe.

Druga zdravila in zdravilo Zolsana

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zaspanost in psihomotorična prizadetost naslednji dan, vključno s prizadeto zmožnostjo za upravljanje vozil, se lahko povečajo, če jemljete zolpidem z naslednjimi zdravili:

- zdravili za nekatere težave z duševnim zdravjem (antipsihotiki),
- zdravili za težave s spanjem (uspavala),
- zdravili za pomiritev ali zmanjšanje tesnobe,
- zdravili za depresijo,
- zdravili za zmerne do hude bolečine (narkotični analgetiki),
- zdravili za epilepsijo,
- zdravili, ki se uporabljajo za anestezijo,
- zdravili za seneni nahod, izpuščaji ali druge alergije, ki lahko povzročijo zaspanost (sedativni antihistaminiki).

Med jemanjem zolpidema z antidepressivi, vključno z bupropionom, dezipraminom, fluoksetinom, sertralinom in venlafaksinom, se lahko zgodi, da vidite stvari, ki niso resnične (halucinacije).

Zolpidema ni priporočljivo jemati s fluvoksaminom ali ciprofloksacinom.

Posvetujte se z zdravnikom, če jemljete zdravila za zdravljenje bakterijskih ali glivičnih okužb.

Sočasna uporaba zdravila Zolsana in opioidov (močnih zdravil proti bolečini, zdravil za nadomestno zdravljenje in nekaterih zdravil proti kašlju) poveča tveganje za pojav zaspanosti, težav z dihanjem (depresije dihanja), kome in je lahko smrtno nevarna. Zaradi tega sočasna uporaba pride v poštev le, kadar ni drugih možnosti zdravljenja.

Kombinacija z opioidnimi zdravili proti bolečinam (narkotičnimi analgetiki) lahko povzroči tudi vneseno razpoloženje in tako pospeši razvoj odvisnosti.

Če zdravnik kljub temu predpiše zdravilo Zolsana skupaj z opioidi, mora omejiti odmerek in trajanje sočasnega zdravljenja.

Povejte zdravniku, če jemljete katero koli opioidno zdravilo, in natančno upoštevajte zdravnikova priporočila za odmerjanje. Lahko je koristno, če prijateljem in sorodnikom poveste, naj bodo pozorni na zgoraj navedene znake in simptome. Če opazite takšne simptome, obvestite zdravnika.

Pri sočasnem dajanju zdravil, ki sproščajo mišice (mišičnih relaksantov), se njihov učinek lahko poveča – zlasti pri starejših bolnikih in pri višjih odmerkih (tveganje za padce).

Zdravila, ki povečajo delovanje določenih jetrnih encimov (zlasti izoencima CYP3A4 citokroma P450), lahko zmanjšajo učinek zdravila Zolsana (npr. rifampicin, karbamazepin, fenitoin, šentjanževka). Sočasna uporaba zolpidema s šentjanževko ni priporočljiva.

Nasprotno pa lahko določena protiglivična zdravila (azolni antimikotiki, npr. ketokonazol) in določeni antibiotiki (makrolidni antibiotiki), ki zmanjšajo delovanje teh jetrnih encimov, povečajo učinek zdravila Zolsana.

Zdravilo Zolsana skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Sedativni učinek zdravila Zolsana se ob sočasnem uživanju alkohola poveča, zato ga med zdravljenjem ne priporočamo. To lahko vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Sok grenivke lahko poveča učinek zdravila Zolsana.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Uporaba zdravila Zolsana med nosečnostjo ni priporočljiva. Če ste noseči, mislite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom.

Če zdravilo uporabljate med nosečnostjo, obstaja verjetnost, da bo škodilo otroku. Nekatere študije so pokazale, da lahko pri novorojenčku obstaja povečano tveganje za pojav razcepljene ustnice ali neba.

Pri jemanju zdravila Zolsana v drugem in/ali tretjem trimesečju nosečnosti lahko pride do zmanjšane gibanja plodu in do variabilnosti srčne frekvenca pri plodu.

Pri jemanju zdravila Zolsana ob koncu nosečnosti ali med porodom lahko pri dojenčku pride do mišične šibkosti, padca telesne temperature, težav pri hranjenju in težav z dihanjem (sindrom ohlapnega dojenčka).

Pri rednem jemanju zdravila v pozni nosečnosti lahko pri dojenčku pride do fizične odvisnosti in tveganja za pojav odtegnitvenih simptomov, kot je vznemirjenost ali tresenje. V tem primeru je treba v obdobju po porodu novorojenčka skrbno spremljati.

Dojenje

Zdravila Zolsana doječim materam ne priporočamo, ker zolpidem prehaja v materino mleko.

Plodnost

Ni podatka o vplivu na plodnost.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Zolsana močno vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev, povzroča na primer "speče šofiranje". Vedeti morate, da lahko na dan po uporabi zdravila Zolsana (tako kot v primeru drugih uspaval):

- občutite dremavost, zaspanost, omotico ali zmedenost,
- imate podaljšan čas hitrega odločanja,
- imate zamegljen vid ali dvojen vid,
- imate slabšo pozornost.

Da bi omenjene učinke čim bolj zmanjšali, je priporočljivo, da med uporabo zolpidema in upravljanjem vozil ali strojev oziroma delom na višini mine vsaj 8 ur.

Med uporabo zdravila Zolsana ne pijte alkohola in ne jemljite drugih psihoaktivnih snovi, ker to lahko poveča omenjene učinke.

Zdravilo Zolsana vsebuje laktozo in natrij

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo Zolsana vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

3. Kako jemati zdravilo Zolsana

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo Zolsana vzemite z nekaj tekočine.

Odrasli

Priporočeni odmerek na 24 ur je 10 mg (1 tableta) zdravila Zolsana. Nekaterim bolnikom lahko zdravnik predpiše nižji odmerek. Zdravilo Zolsana je treba vzeti:

- v enem zaužitju,
- tik pred spanjem.

Poskrbite, da bo od uporabe tega zdravila do izvajanja dejavnosti, ki zahtevajo zbranost, minilo vsaj 8 ur.

Ne prekoračite odmerka 10 mg na 24 ur.

Starejši ali oslabele bolniki

Za starejše ali oslabele bolnike je začetni odmerek 5 mg (½ tablete).

Bolniki z zmanjšanim delovanjem jeter

Za bolnike z zmanjšanim delovanjem jeter je priporočeni odmerek 5 mg (½ tablete).

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Zolpidema ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ker ni podatkov, ki bi podpirali njegovo uporabo v tej starostni skupini.

Trajanje zdravljenja

Trajanje zdravljenja je od nekaj dni do dveh tednov, do največ 4 tedne, vključno s časom postopnega zmanjševanja odmerka. Vaš zdravnik vam bo povedal, kako dolgo bo trajalo zdravljenje z zdravilom Zolsana, in vam dal potrebna navodila za prenehanje zdravljenja. Čas zdravljenja lahko po oceni vašega stanja podaljša le vaš zdravnik.

Z nenadnim prenehanjem zdravljenja se lahko pojavijo odtegnitveni simptomi.

Če menite, da je učinek zdravila Zolsana premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Zolsana, kot bi smeli

V primeru prevelikega odmerka se lahko simptomi spreminjajo od zaspanosti do nezavesti (kome). Če ste vzeli prevelik odmerek, se takoj posvetujte s svojim zdravnikom.

Vzemite to navodilo in preostale tablete s seboj, da jih boste pokazali zdravniku.

Znaki (rahlega) prevelikega odmerjanja lahko vključujejo zaspanost, omotico, zamegljen vid, nerazločen govor, padec krvnega tlaka, nestabilno hojo in gibe, šibkost mišic, zmedenost in halucinacije. V primerih hude zastrupitve se lahko pojavijo: globok spanec vse do nezavesti, vznemirjenost, motnje dihanja in cirkulatorni kolaps. Poročali so o primerih prevelikega odmerjanja zolpidema (samega ali v kombinaciji z drugimi zaviralci osrednjega živčevja, vključno z alkoholom) z resnimi posledicami (vključno s smrtnim izidom).

Če ste pozabili vzeti zdravilo Zolsana

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Tableto lahko vzamete samo v primeru, če imate še vedno na voljo 7–8 ur spanja. Če to ni možno, vzemite tablete naslednji dan pred spanjem.

Če ste prenehali jemati zdravilo Zolsana

Če želite prenehati z zdravljenjem, se najprej posvetujte z zdravnikom.

Ob fizični odvisnosti bodo nenadno prekinitve zdravljenja spremljali odtegnitveni simptomi, kot so glavoboli ali mišične bolečine, zelo huda tesnoba in napetost, nemir, zmedenost ter razdražljivost. Svetujemo vam, da zdravljenja z zdravilom Zolsana ne prenehate nenadoma, temveč odmerek zmanjšujete postopoma po navodilih zdravnika.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Zdi se, da so ti učinki povezani z občutljivostjo posameznika. Pojavljajo se pogosteje v uri po zaužitju tablete, če ne greste v posteljo ali ne zaspate takoj.

Obstajajo dokazi, da so neželeni učinki odvisni od odmerka, zlasti tisti, ki vplivajo na osrednje živčevje. Za zmanjšanje teh neželenih učinkov je treba zolpidem vzeti tik pred spanjem ali v postelji, kot je priporočeno. Neželeni učinki se pogosteje pojavijo pri starejših bolnikih.

Naslednji neželeni učinki se pojavijo predvsem na začetku zdravljenja in navadno izginejo po večkratni uporabi:

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- okužba zgornjih dihal, okužba spodnjih dihal
- halucinacije, agitacija, nočne more, depresija, otopelost, zmedenost,
- zaspanost naslednji dan, glavobol, omotica, vrtoglavica (občutek vrtenja z izgubo ravnotežja), poslabšanje nespečnosti, zmanjšana pozornost, kognitivne motnje, kot je anterogradna amnezija (izguba spomina za dogodke po zaužitju zdravila),
- dvojni vid,
- slabost, driska, bruhanje, bolečine v trebuhu,
- bolečine v hrbtu,
- utrujenost.

Z višjimi odmerki se povečuje tveganje za izgubo spomina, ki ga lahko spremlja neprimerno obnašanje.

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- motnje apetita,
- nemir, razdražljivost, agresivnost, hoja v spanju ali druga nenavadna vedenja med spanjem, kot na primer vožnja avtomobila, priprava in uživanje hrane, telefonski pogovori ali spolni odnosi med spanjem, ne da bi bili popolnoma budni (glejte poglavje »Opozorila in previdnostni ukrepi«), evforično razpoloženje,

- mravljinčenje ali otrplost (parestezije), tresenje, motnje pozornosti, motnje govora, neusklajenost mišičnih gibov (ataksija),
- zamegljen vid,
- povišanje ravni jetrnih encimov,
- kožni izpuščaj, srbenje (pruritus), prekomerno znojenje (hiperhidroza), kožne (alergijske) reakcije
- motena koordinacija,
- bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, mišični krči, bolečine v vratu, mišična oslabelost.

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- motnje spolne sle,
- zmanjšana stopnja zavesti,
- okvara vida,
- poškodba jeter (hepatocelularna, holestatska ali mešana),
- koprivnica (urtikarija),
- motnje pri hoji, tveganje za padce (predvsem pri starejših bolnikih in kadar se zolpidem ne jemlje v skladu s predpisanimi priporočili).

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1. od 10.000 bolnikov)

- blodnje (zmotna/neresnična prepričanja), odvisnost (nenadno prenehanje zdravljenja ima lahko za posledico odtegnitvene učinke in vrnitev težav),
- depresija dihanja (zmanjšana dihalna funkcija).

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- otekanje kože in sluznice (angioedem),
- bes, nenormalno obnašanje,
- toleranca na zdravilo,
- delirij (nenadna in huda sprememba duševnega stanja, ki povzroči, da je oseba videti zmedena ali dezorientirana).

Tveganje za pojav paradoksne reakcije (kot npr. nemir, razburjenje, razdražljivost, agresivnost, neresnična prepričanja, bes, nočne more, halucinacije, psihoze, neprimerno vedenje in drugi neželeni učinki na obnašanje) je večje pri starejših bolnikih. V primeru slednjega je treba zdravljenje prekiniti.

Med uporabo zdravila Zolsana ali drugih uspalav se lahko pojavi prej nepotrjena depresija.

Uporaba lahko povzroči fizično odvisnost, prenehanje zdravljenja pa odtegnitvene simptome ali povrnitev simptomov, ki so bili prisotni pred zdravljenjem. Lahko se pojavi tudi psihična odvisnost.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Zolsana

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Zolsana

- Učinkovina je zolpidemijev tartrat. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg zolpidemijevega tartrata.
- Druge sestavine zdravila so laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza (E460), natrijev karboksimetilškrob (vrsta A), magnezijev stearat (E470b) in hipromeloza (E464) v jedru tablete ter hipromeloza (E464), titanov dioksid (E171) in makrogol 400 v filmski oblogi. Glejte poglavje 2 "Zdravilo Zolsana vsebuje laktozo in natrij".

Izgled zdravila Zolsana in vsebina pakiranja

Tablete so bele, ovalne, bikonveksne, z razdelilno zarezo na obeh straneh in oznako "ZIM" in "10" na eni strani. Tableta se lahko deli na enake odmerke.

Škatla z 20 filmsko obloženimi tabletami v 2 pretisnih oмотih z 10 tabletami.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Zolsana

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Proizvajalec

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
Synthon Hispania S.L., Castello 1 Polígono Las Salinas 08830 San Boi de Llobregat, Španija
Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Nizozemska

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne **12. 12. 2024**.